

Cultivare poinsettia



Stadiu de răsad : 83 buc/tăviță

Dupa plantarea in ghivece butașii înrădăcinați (incepand cu luna Iunie– August) se ciupesec deasupra a 3 – 4 frunze pentru stimularea ramificării , lucrare ce poate fi repetată și pe lăstarii care apar in urma primei ciupiri.

Pentru inducerea unei creșteri mai compacte a plantelor se fac tratamente cu regulatori de creștere in momentul cand lastarii porniți in urma ciupirilor au 4 – 5 cm lungime. Aceste tratamente pot fi repetate la interval de 3 săptămăni pe tot parcursul verii, in funcție de gradul de piticire pe care dorim să il inducem plantelor.

Temperatura : ziua între 24-27 °C si noaptea minim 16°C.

Daca temperatura scade sub 10 °C cultura este intarziata.

Odată ce frunzele (bracteele) sunt complet formate, mulți cultivatori scad temperatura la 10 °C pe timp de noapte pentru a intensifica colorarea lor.

Lumina : puțin umbrit

Pe masura ce plantele cresc , ele se transplantează in ghivece mai mari , ultimul ghiveci cu care planta se comercializează avand diametrul de 12 – 14 cm.

La substratul folosit (exemplu : Klasmann TS4 medium cu argila) se recomandă adăugarea de îngrășămintă. (exemplu :OSMOCOTE EXACT 15-9-12+2Mg+ME – 5-6 luni). Acesta se va menține permanent reavan , evitandu-se atat excesul , cat și insuficiența apei.

Săptămănal se fac fertilizări pentru devoltare cat și pentru inflorire (exemplu : Peters Prof Poinsettia Mix 17-07-27 +2MgO +ME sau Universol Violet 10-10-30).

Poinsettia este ceea ce se numește o cultură de zi scurtă, ceea ce înseamnă că în mod natural inflorește atunci când nopțile devin mai lungi decât zilele. În producția comercială mulți cultivatori folosesc pânză neagră pentru a produce fie recolte mai devreme sau să facă întreaga recoltă mai uniformă.

Toate informațiile de mai sus sunt prezentate de compania SolmixFlor Srl cu cele mai bune intenții și nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice pierderi de culturi bazate pe recomandările de mai sus.